

**CONSENSO INFORMATO ALL'INTERVENTO CHIRURGICO DI
LIFTING FRONTALE E/O SOPRACCIGLIARE**

Dr RAFFAELE RAUSO
Medico Chirurgo

chirurgiadellabella

Consegnato il.....

Paziente.....Firma per ricezione.....

Si raccomanda il paziente di leggere scrupolosamente e con calma quanto segue, e assolutamente di non firmare in caso di incomprensione totale o parziale.

Prima di illustrarLe rischi vs benefici dell'intervento proposto è importante che lei sappia che:

lo scopo della chirurgia plastica estetica è quello correggere difetti o dismorfie di varia natura. Chi si aspetta dalla chirurgia plastica estetica trasformazioni miracolose è destinato a inevitabili delusioni.

La chirurgia plastica estetica comporta atti medici e chirurgici e, poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non lo è nemmeno la chirurgia plastica estetica. Si deduce che non può essere pronosticata in modo preciso la percentuale di miglioramento del difetto da correggere, l'entità e la durata del risultato e la qualità delle cicatrici residue. E' necessario sottolineare che alcuni fattori condizionano il risultato finale: fra questi, in primo luogo ma non solo, i processi di guarigione e di cicatrizzazione che continuano per mesi dopo l'intervento e non sono completamente controllabili dal chirurgo, né dal paziente, le condizioni generali di salute e le abitudini di vita del paziente, la sua età, le caratteristiche specifiche della pelle e del tessuto sottocutaneo, l'aspetto fisico, e le influenze ormonali ed ereditarie. Tali elementi insieme ad altri fattori, influenzano la variabilità del

risultato finale. Ogni atto chirurgico così come la chirurgia plastica estetica, produce inevitabilmente sequele, di differente entità a seconda del tipo d'intervento e del caso specifico, che devono essere valutate prima di sottoporsi all'intervento: fra queste inevitabili sono le cicatrici. Il più delle volte, peraltro, a seguito di tali interventi, le ferite chirurgiche, situate lungo pieghe o solchi naturali, o comunque occultate per quanto possibile in sedi difficilmente accessibili allo sguardo, appaiono poco visibili, ma in realtà sono permanenti ed indelebili.

Talora, a causa di una particolare predisposizione individuale, di sopravvenute complicazioni post-operatorie o di una scarsa attenzione del paziente ai suggerimenti impartiti, le cicatrici possono risultare di qualità scadente. E' bene quindi ricordare che il chirurgo plastico può garantire solo delle ferite chirurgiche suture con grande precisione, non delle cicatrici invisibili. Come in qualsiasi tipo di chirurgia, anche in chirurgia plastica estetica, sono possibili errori e complicanze. I primi, imprevedibili e indesiderabili e le seconde, prevedibili e a volte inevitabili, rientrano fra i rischi che ogni paziente deve considerare prima dell'intervento. Di conseguenza, per i suddetti motivi, pur rispettando le regole della chirurgia plastica, l'intervento potrebbe non determinare, seppure in casi particolari, il conseguimento degli obiettivi e del risultato auspicato che, di conseguenza, non può essere garantito o assicurato.

ISTRUZIONI

Questo documento è stato redatto per contribuire ad informarvi sull'intervento di lifting frontale e/o sopraccigliare, sui relativi rischi e sui trattamenti alternativi.

È importante che leggete tutte queste informazioni con attenzione. Firmate ogni singola pagina, confermando di aver letto tutte le informazioni e firmate il consenso per l'intervento chirurgico suggerito dal Vostro chirurgo.

INTRODUZIONE

L'area sopraccigliare e fronto-temporale mostra spesso i segni più evidenti dell'invecchiamento. Il cedimento cutaneo di queste zone può causare il rilassamento dei sopraccigli, abbassamento della palpebra, solchi sulla fronte e rughe di espressione. Nell'intervento di lifting sopraccigliare, le zone responsabili di questi problemi sono tirate o rimodellate per lisciare la fronte, per alzare i sopraccigli superiori e per migliorare le rughe di espressione. Un lifting sopraccigliare può essere effettuato singolarmente o contemporaneamente ad altri interventi, quali un facelift o una blefaroplastica.

Le più recenti scoperte della chirurgia permettono di effettuare un intervento di lifting sopraccigliare con vari metodi, compresa l'endoscopia. L'intervento di lifting sopraccigliare è individuale per ogni paziente. Le incisioni chirurgiche possono variare a seconda della tecnica scelta dal Vostro chirurgo in conformità alle Vostre esigenze. Il lifting sopraccigliare non può arrestare il processo di invecchiamento.

TRATTAMENTI ALTERNATIVI

I trattamenti alternativi consistono nel non trattare il rilassamento a livello frontale e sopraccigliare con un intervento di lifting frontale e/o sopraccigli. Il cedimento cutaneo e le rughe possono essere eliminati anche attraverso altri trattamenti (e.g. Infiltrazioni di Tossina Botulinica tipo A) o interventi. Rischi e potenziali complicazioni sono associati a forme alternative di trattamento o chirurgia.

I RISCHI DI UN LIFTING FRONTALE E/O SOPRACCIGLIARE

Ogni intervento chirurgico comporta dei rischi seppur minimi ed è importante che capiate i rischi legati ad un lifting sopraccigliare. La scelta individuale di sottoporsi ad un intervento chirurgico si basa sul confronto tra il rischio reale ed il beneficio potenziale. Anche se la maggior parte dei pazienti non avrà le complicazioni qui di seguito elencate, dovete analizzare ciascuna di queste complicazioni con il Vostro chirurgo per conoscere veramente tutte le conseguenze possibili di un lifting sopraccigliare.

Sanguinamento - E possibile, benché insolita, una perdita di sangue durante o dopo l'intervento. In caso di sanguinamento post-operatorio, può essere necessario un trattamento di emergenza per drenare il sangue accumulato (ematoma). Non prendere aspirine o farmaci antinfiammatori per dieci giorni prima dell'intervento, in quanto questo può aumentare il rischio di sanguinamento. Accumuli di sangue sotto la cute possono ritardare la guarigione e creare cicatrici. "Erbe" e supplementi dietetici possono aumentare il rischio di sanguinamento.

Infezione - L'infezione è abbastanza anomala in questo tipo di intervento. Se interviene un'infezione, è necessario ricorrere ad un trattamento antibiotico o ad un intervento supplementare.

Diminuita sensibilità della pelle – Dopo un lifting sopraccigliare l'eventuale diminuzione (o perdita) della sensibilità della pelle nella zona del cuoio capelluto e della faccia potrebbe non scomparire completamente. Sensazioni costanti di prurito potrebbero verificarsi sul cuoio capelluto e sulla fronte dopo questo tipo di intervento.

Irregolarità nel profilo - Irregolarità, depressioni e pieghe nella pelle potrebbero verificarsi dopo un lifting dei sopraccigli.

Cicatrizzazione – Cicatrici ipertrofiche sono molto rare. In casi rari, potrebbero formarsi delle

cicatrici anomale. Le cicatrici possono risultare antiestetiche e di colore differente rispetto alla pelle circostante. Vi è la possibilità di segni visibili dovuti a suture, graffette o fissaggi utilizzati durante il lifting sopracciliare. Potrebbero rendersi necessari trattamenti supplementari compreso un altro intervento per eliminare una cicatrice anomala.

Modifica del metodo chirurgico per lifting frontale e/o sopraccigliare - In alcune situazioni, a seconda di fattori emersi soltanto nel corso dell'intervento, il Vostro chirurgo potrebbe dover fare dei cambiamenti nella tecnica e nel metodo chirurgico del lifting sopraccigliare. Ciò potrebbe voler dire passare da un intervento con 3 o più accessi chirurgici nel cuoio capelluto ad un intervento di lifting sopracciliare e/o frontale con accesso bi-coronale incisione nel cuoio capelluto (dall'apice di un orecchio all'altro), a meno che questo non sia stato già concordato pre-operatoriamente.

Anestesia chirurgica - Sia l'anestesia locale che totale comportano dei rischi. Vi è la possibilità di complicazioni, inconvenienti e addirittura di morte in tutte le forme di anestesia o sedazione.

Compromissione del nervo – Durante un intervento di lifting frontale e/o sopraccigliare c'è il pericolo di danneggiare sia i nervi motori che sensoriali. Dopo l'intervento possono verificarsi debolezza o perdita di motilità della fronte o del sopracciglio superiore. La maggior parte degli individui noterà un recupero della funzione motoria; l'astenia permanente è rara. Può anche verificarsi una compromissione dei nervi sensoriali della fronte, del cuoio capelluto e dell'area temporale. Può verificarsi una diminuzione di sensibilità nell'area del cuoio capelluto dopo un intervento di lifting sopracciliare. L'intorpidimento permanente o una cicatrice su un nervo dolorante sono rari.

Danneggiamento delle strutture più profonde - Le strutture più profonde, quali l'occhio, i nervi, i vasi sanguigni, l'osso cranico ed i muscoli, possono essere danneggiate durante il corso dell'intervento. La possibilità che questo accada varia a seconda del tipo di intervento chirurgico

scelto per il lifting frontale e/o sopraccigliare.

Asimmetria -Il volto è per sua natura asimmetrico. Sicuramente dopo l'intervento le due arcate sopraccigliari risulteranno asimmetriche se valutate singolarmente, l'importanza di questo intervento però è dare armonia e luce al volto.

Guarigione lenta – Può verificarsi un'apertura della ferita o una sua guarigione lenta. Alcune zone della fronte e del cuoio capelluto possono guarire in modo anormale e lento. Alcune zone di pelle possono deperire, richiedendo frequenti cambi di fasciatura o ulteriori interventi per rimuovere il tessuto non guarito. **I fumatori hanno un rischio più elevato di perdita della pelle e di complicanze durante la guarigione.**

Reazioni allergiche – Raramente sono state segnalate allergie locali a cerotti, materiale di sutura o medicazioni. Le reazioni sistemiche più serie possono derivare dai farmaci usati durante la chirurgia o da farmaci prescritti. Le reazioni allergiche possono richiedere un trattamento supplementare.

Siero - Raramente si verificano accumuli di liquido sotto la pelle. Se questo accade, ciò può richiedere trattamenti supplementari per il drenaggio del liquido.

Effetti a lungo termine - Alterazioni del risultato a livello frontale e sopraccigliare possono verificarsi dopo un certo periodo e sono riconducibili ad invecchiamento, perdita o aumento del peso, esposizione al sole o altre circostanze non legate al lifting sopraccigliare. L'intervento di lifting frontale e/o sopraccigliare non arresta il processo di invecchiamento o non produce il rassodamento permanente della fronte. Un ritocco o un intervento supplementare potranno rendersi necessari per mantenere costanti i risultati del lifting frontale e/o sopraccigliare.

Irritazione all'occhio - L'irritazione o secchezza degli occhi può verificarsi dopo un lifting frontale e/o sopraccigliare o quando il paziente fa contemporaneamente anche una blefaroplastica.

Dolore - Molto raramente si segnala dolore cronico dopo un lifting sopracciliare.

Perdita dei capelli - La perdita dei capelli può verificarsi in prossimità del cuoio capelluto o lungo le incisioni chirurgiche. Questo caso non è prevedibile. La perdita di capelli può risolversi lentamente e in casi rari può essere permanente.

Fissaggi e suture più profonde - Alcune tecniche chirurgiche utilizzano piccole viti o suture profonde permanenti per sospendere le strutture della fronte. In circostanze molto rare, una vite potrebbe penetrare nel cranio. Una ferita intracranica è insolita, ma possibile. Se questo accade, si rende necessario un trattamento supplementare. In un secondo momento potrà essere necessaria la rimozione dei fissaggi o delle suture più profonde.

Problemi alla palpebra – Problemi che riguardano la posizione anormale delle palpebre superiori (ptosi della palpebra), la pelle allentata della palpebra o il rilassamento anormale della palpebra inferiore (ectropion) possono accompagnare il rilassamento del sopracciglio e della fronte. L'intervento di lifting frontale e/o sopraccigliare non correggerà questi problemi. Potranno rendersi necessari ulteriori interventi per correggerli.

Risultato insoddisfacente - Potreste essere delusi dal risultato dell'intervento. Raramente, è necessario effettuare un ritocco per migliorare i risultati.

NECESSITÀ DI UN INTERVENTO SUPPLEMENTARE

Ci sono molte variabili oltre al rischio e alle complicazioni chirurgiche potenziali che possono influenzare il risultato duraturo di un lifting. Anche se i rischi e le complicazioni si verificano raramente, i rischi citati sono quelli che sono maggiormente associati con un intervento di browlift o facelift. Altre complicità e rischi possono verificarsi, ma sono più rari. Se dovessero emergere

delle complicazioni, può essere necessario un intervento supplementare o altri trattamenti. L'impiego della medicina e della chirurgia non è una scienza esatta. Anche se sono prevedibili buoni risultati, non c'è garanzia assoluta o implicita che tali risultati possano essere ottenuti.

Autorizzo il Dr Rauso

ed i suoi collaboratori ad eseguire su di me l'intervento di **FRONTALE E/O SOPRACCIGLIARE**

So che dovrò nessere sottoposto/a ad anestesia

Autorizzo il Dr Rauso

ed i suoi collaboratori a modificare secondo scienza e coscienza e secondo le contingenti necessità le tecniche programmate, sia nel corso dell'intervento stesso che nel periodo post-operatorio, essendo informato/a che, in caso contrario, potrei compromettere l'esito dell'intervento.

Poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può essere precisamente prognosticata a priori la percentuale di miglioramento del difetto da correggere e l'entità la durata del risultato, così come la qualità delle cicatrici residue e l'eventuale costituzione di ematomi e sieromi, in quanto tali eventi dipendono non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate ma ancor più dalle risposte dell'organismo. Tali complicazioni possono essere trattate e a tal fine acconsento a sottopormi alle cure del caso, eventualmente anche chirurgiche.

Acconsento ad essere fotografato/a prima, durante e dopo l'intervento, a scopo di documentazione clinica, che il Dr Rauso si impegna ad usare solo in contesto scientifico-didattico con assoluta garanzia di anonimato.

.....

Firma del paziente

.....

Firma del chirurgo

Data e luogo.....