

# chirurgiadellabrezza

## **CONSENSO INFORMATO ALL'INTERVENTO CHIRURGICO DI LIFTING COSCE**

Dr RAFFAELE RAUSO  
Medico Chirurgo

Consegnato il.....

Paziente.....Firma per ricezione.....

**Si raccomanda il paziente di leggere scrupolosamente e con calma quanto segue, e assolutamente di non firmare in caso di incomprensione totale o parziale.**

Prima di illustrarLe rischi vs benefici dell'intervento proposto è importante che lei sappia che:

lo scopo della chirurgia plastica estetica è quello correggere difetti o dismorfie di varia natura. Chi si aspetta dalla chirurgia plastica estetica trasformazioni miracolose è destinato a inevitabili delusioni.

La chirurgia plastica estetica comporta atti medici e chirurgici e, poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non lo è nemmeno la chirurgia plastica estetica. Si deduce che non può essere pronosticata in modo preciso la percentuale di miglioramento del difetto da correggere, l'entità e la durata del risultato e la qualità delle cicatrici residue. E'

necessario sottolineare che alcuni fattori condizionano il risultato finale: fra questi , in primo luogo ma non solo, i processi di guarigione e di cicatrizzazione che continuano per mesi dopo l'intervento e non sono completamente controllabili dal chirurgo, né dal paziente, le condizioni generali di salute e le abitudini di vita del paziente, la sua età, le caratteristiche specifiche della pelle e del tessuto sottocutaneo, l'aspetto fisico, e le influenze ormonali ed ereditarie. Tali elementi insieme ad altri fattori, influenzano la variabilità del risultato finale. Ogni atto chirurgico così come la chirurgia plastica estetica, produce inevitabilmente sequele, di differente entità a seconda del tipo d'intervento e del caso specifico, che devono essere valutate prima di sottoporsi all'intervento: fra queste inevitabili sono le cicatrici. Il più delle volte, peraltro, a seguito di tali interventi, le ferite chirurgiche, situate lungo pieghe o solchi naturali, o comunque occultate per quanto possibile in sedi difficilmente accessibili allo sguardo, appaiono poco visibili, ma in realtà sono permanenti ed indelebili.

Talora, a causa di una particolare predisposizione individuale, di sopravvenute complicazioni post-operatorie o di una scarsa attenzione del paziente ai suggerimenti impartiti, le cicatrici possono risultare di qualità scadente. E' bene quindi ricordare che il chirurgo plastico può garantire solo delle ferite chirurgiche suturate con grande precisione, non delle cicatrici invisibili. Come in qualsiasi tipo di chirurgia, anche in chirurgia plastica estetica, sono possibili errori e complicanze. I primi, imprevedibili e indesiderabili e le seconde, prevedibili e a volte inevitabili, rientrano fra i rischi che ogni paziente deve considerare prima dell'intervento. Di conseguenza, per i suddetti motivi, pur rispettando le regole della chirurgia plastica, l'intervento potrebbe non

determinare, seppure in casi particolari, il conseguimento degli obiettivi e del risultato auspicato che, di conseguenza, non può essere garantito o assicurato.

## **INFORMAZIONI GENERALI**

Lo scopo del seguente modulo di consenso è di fornire al paziente, in aggiunta al colloquio preoperatorio con il chirurgo, le informazioni riguardanti le caratteristiche ed i rischi connessi con all'intervento di LIFTING DELLE COSCE. La preghiamo pertanto di leggere attentamente quanto segue, di discutere con il chirurgo la spiegazione di ogni termine che non fosse chiaro e quindi di firmare questo documento come conferma di avere ben compreso le informazioni ricevute. Una ridondanza o lassità cutanea della faccia interna delle cosce può essere corretta mediante un intervento chirurgico.

Tale intervento, detto lifting delle cosce, è volto alla asportazione della cute in eccesso in corrispondenza della regione interna delle cosce. E' necessario essere consapevoli che, in ogni caso, non è possibile restituire la tensione e la compattezza che i tessuti hanno di solito nella giovinezza. All'intervento residuano cicatrici estese nel solco inguinale e nel solco gluteo, ordinariamente occultabili sotto un costume da bagno non troppo sgambato. Le cicatrici possono tuttavia, per effetto della forza di gravità, spostarsi al di sotto del solco, diventando quindi più visibili. I giorni di degenza (di solito 1-2), la frequenza delle medicazioni, l'epoca della rimozione dei punti, dipendono dal singolo caso clinico. Il risultato è generalmente soddisfacente fin dai primi tempi, anche se si può rendere necessario un ritocco delle cicatrici.

## **I RISCHI DI UN LIFTING COSCE**

La scelta individuale di sottoporsi ad un intervento chirurgico si basa sul confronto tra il rischio reale ed il beneficio potenziale. Anche se la maggior parte dei pazienti non avrà le complicazioni

qui di seguito elencate, dovete analizzare ciascuna di queste complicazioni con il Vostro chirurgo per conoscere veramente tutte le conseguenze possibili di un LIFTING COSCE:

**Sanguinamento** - E possibile, benché insolita, una perdita di sangue durante o dopo l'intervento. In caso di sanguinamento post-operatorio, può essere necessario un trattamento di emergenza per drenare il sangue accumulato (ematoma). Non prendere aspirine o farmaci antinfiammatori per dieci giorni prima dell'intervento, in quanto questo può aumentare il rischio di sanguinamento. Accumuli di sangue sotto la cute possono ritardare la guarigione e creare cicatrici. "Erbe" e supplementi dietetici possono aumentare il rischio di sanguinamento.

**Infezione** - L'infezione è abbastanza anomala in questo tipo di intervento; in caso di infezione bisognerà un'antibioticoterapia idonea

**Diminuita sensibilità della zona trattata** – Dopo un lifting cosce l'eventuale diminuzione (o perdita) della sensibilità nella zona trattata potrebbe non scomparire completamente. Sensazioni costanti di prurito potrebbero verificarsi dopo questo tipo di intervento.

**Irregolarità nel profilo** - Irregolarità, depressioni e pieghe delle cosce potrebbero verificarsi dopo un lifting delle cosce

**Cicatrizzazione** – Cicatrici ipertrofiche sono molto rare. In casi rari, potrebbero formarsi delle cicatrici anomale. Le cicatrici possono risultare antiestetiche e di colore differente rispetto alla pelle circostante. Potrebbero rendersi necessari trattamenti supplementari compreso un altro intervento per eliminare una cicatrice anomala.

**Asimmetria** -Il corpo è per sua natura asimmetrico. Sicuramente dopo l'intervento le due cosce risulteranno asimmetriche se valutate singolarmente, l'importanza di questo intervento però è dare armonia all'area trattata.

**Guarigione lenta** – Può verificarsi un'apertura della ferita o una sua guarigione lenta. I fumatori hanno un rischio più elevato di perdita della pelle e di complicanze durante la guarigione.

**Siero** - Raramente si verificano accumuli di liquido sotto la pelle. Se questo accade, ciò può richiedere trattamenti supplementari per il drenaggio del liquido.

**Effetti a lungo termine** - Alterazioni del risultato possono verificarsi nel post-operatorio soprattutto nei casi di calo ponderale. Un ritocco o un intervento supplementare potranno rendersi necessari per mantenere costanti i risultati del lifting cosce.

**Risultato insoddisfacente** - Potreste essere delusi dal risultato dell'intervento. Raramente, è necessario effettuare un ritocco per migliorare i risultati.

## **PRIMA DELL'INTERVENTO DI LIFTING DELLE COSCE**

- \* Informare il chirurgo di qualsiasi eventuale trattamento con farmaci (soprattutto cortisonici, contraccettivi, antipertensivi, cardioattivi, anticoagulanti, ipoglicemizzanti, antibiotici, tranquillanti, sonniferi, eccitanti, ecc.)
- \* sospendere l'assunzione di medicinali contenenti acido acetilsalicilico (es. Alka Seltzer, Ascriptin, Aspirina, Bufferin, Cemerit, Vivin C, ecc) o altri antinfiammatori non steroidei.
- \* Se possibile, segnalare i periodi del ciclo mestruale.
- \* Eliminare o ridurre il fumo almeno una settimana prima dell'intervento.
- \* Segnalare immediatamente l'insorgenza di raffreddore, mal di gola, tosse, malattie della pelle.
- \* Organizzare, per il periodo post-operatorio, la presenza di un accompagnatore/trice, che può essere utile, anche se non indispensabile.
- \* Procurarsi una guaina elastica.

## **ALLA VIGILIA DELL'INTERVENTO DI LIFTING DELLE COSCE**

- \* Non assumere cibi né bevande, a partire dalla mezzanotte.
- \* Praticare un accurato bagno di pulizia completo; rimuovere lo smalto dalle unghie delle mani e dei piedi; depilare il pube.

## **IL GIORNO DELL'INTERVENTO DI LIFTING DELLE COSCE**

\* Mantenere rigorosamente il digiuno e indossare un indumento da notte completamente apribile sul davanti con maniche molto comode.

## **DOPO L'INTERVENTO DI LIFTING DELLE COSCE**

- \* Alla dimissione farsi accompagnare a casa in automobile.
- \* Per almeno 7 giorni indossare la guaina elastica posta dal medico, senza mai toglierla.
- \* Non fumare, per evitare colpi di tosse con relativo dolore e possibili sanguinamenti.
- \* E' consentita una cauta ripresa della attività sessuale non prima di tre settimane.
- \* Per almeno 2 settimane non guidare l'automobile.
- \* per almeno un mese non praticare sport né fare ginnastica.
- \* E' possibile praticare una doccia di pulizia solo dopo la rimozione dei punti.
- \* Per almeno un mese evitare l'esposizione diretta al sole o al calore intenso (es.sauna, lampade UVA)

**Al minimo dubbio di un andamento anormale del periodo postoperatorio o per qualsiasi altro problema inerente l'intervento, consultate senza esitazione il Vostro Chirurgo**

## CONSENSO INFORMATO AD INTERVENTO DI LIFTING DELLE COSCE

Io sottoscritto/a

Nome.....

Cognome.....

### DICHIARO

di avere letto il protocollo di consenso informato unito alla presente scheda.

Inoltre, l'intervento mi è stato dettagliatamente illustrato dal chirurgo e ritengo di averne compreso scopi e limiti.

In particolare so che:

\* All'intervento residueranno necessariamente delle cicatrici, in genere occultabili sotto una mutandina non troppo sgambata. In alcuni casi le cicatrici possono dislocarsi al di sotto del solco inguinale, diventando quindi visibili al di fuori della mutandine.

\* Nel periodo post-operatorio si potrà avvertire dolore, soprattutto durante la deambulazione, che si attenuerà nel giro di pochi giorni.

\* È possibile che si manifestino edemi ed ecchimosi, che hanno la tendenza a migrare verso il basso. Essi scompaiono di solito in uno-due mesi.

\* La sensibilità delle regione interna delle cosce potrà rimanere alterata per un periodo variabile, eccezionalmente in forma duratura.

\* L'intervento di lifting delle cosce, come tutte le procedure chirurgiche, è soggetto a complicazioni quali ematoma, sieroma e infezione.



## **AUTORIZZO**

Il Dr Raffaele Rauso

ed i suoi collaboratori ad eseguire su di me l'intervento di LIFTING COSCE

So che dovrò essere sottoposto/a ad anestesia.....

## **AUTORIZZO**

Il Dr Raffaele Rauso ed i suoi collaboratori a modificare secondo scienza e coscienza e secondo le contingenti necessità le tecniche programmate, sia nel corso dell'intervento stesso che in periodo post-operatorio.

Accetto di sottopormi alle terapie mediche e fisiche che mi verranno prescritte nel periodo postoperatorio, essendo informato/a che, in caso contrario, potrei compromettere l'esito dell'intervento.

Poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può essere programmato a priori il preciso risultato, in quanto i processi di cicatrizzazione profonda dipendono non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate, ma ancor più dalle risposte dell'organismo.

Eventuali complicazioni, quali ematomi, sieromi o infezione, possono essere trattate e, a tal fine, acconsento a sottopormi alle cure del caso, eventualmente anche chirurgiche.

Acconsento ad essere fotografato/a e/o ripreso prima, durante e dopo l'intervento, da parte del Dr Rauso.

Esonero il Dr Rauso e la sua equipe da qualsiasi tipo di controversia legale post operatoria (richieste di risarcimento) nel caso subentri una o più complicanze

contemplate per questo intervento, a meno che non sia possibile chiaramente dimostrare una responsabilità diretta legata ad un errore professionale. Inoltre sono cosciente che nel caso subentrassero delle complicanze post operatorie che richiedono un reintervento dovrò sostenere le “spese vive” (clinica ed eventuali materiali protesici), mentre il supporto dell’equipe chirurgica sarà gratuito.

.....

Firma del paziente

.....

Firma del chirurgo

Data e luogo.....