

**CONSENSO INFORMATO ALL'INTERVENTO CHIRURGICO DI
LIFTING DIRETTO DELLE LABBRA**

Dr RAFFAELE RAUSO
Medico Chirurgo

chirurgiadellabrezza

Consegnato il.....

Paziente.....Firma per ricezione.....

Si raccomanda il paziente di leggere scrupolosamente e con calma quanto segue, e assolutamente di non firmare in caso di incomprensione totale o parziale.

Prima di illustrarLe rischi vs benefici dell'intervento proposto è importante che lei sappia che:

lo scopo della chirurgia plastica estetica è quello correggere difetti o dismorfie di varia natura. Chi si aspetta dalla chirurgia plastica estetica trasformazioni miracolose è destinato a inevitabili delusioni.

La chirurgia plastica estetica comporta atti medici e chirurgici e, poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non lo è nemmeno la chirurgia plastica estetica. Si deduce che non può essere pronosticata in modo preciso la percentuale di miglioramento del difetto da correggere, l'entità e la durata del risultato e la qualità delle cicatrici residue. E' necessario sottolineare che alcuni fattori condizionano il risultato finale: fra questi, in primo luogo ma non solo, i processi di guarigione e di cicatrizzazione che continuano per mesi dopo l'intervento e non sono completamente controllabili dal chirurgo, né dal paziente, le condizioni generali di salute e le abitudini di vita del paziente, la sua età, le caratteristiche specifiche della pelle e del tessuto sottocutaneo, l'aspetto fisico, e le influenze ormonali ed ereditarie. Tali elementi insieme ad altri fattori, influenzano la variabilità del risultato finale. Ogni atto chirurgico così come la chirurgia plastica estetica, produce inevitabilmente sequele, di differente entità a seconda del tipo d'intervento e del caso specifico, che

devono essere valutate prima di sottoporsi all'intervento: fra queste inevitabili sono le cicatrici. Il più delle volte, peraltro, a seguito di tali interventi, le ferite chirurgiche, situate lungo pieghe o solchi naturali, o comunque occultate per quanto possibile in sedi difficilmente accessibili allo sguardo, appaiono poco visibili, ma in realtà sono permanenti ed indelebili.

Talora, a causa di una particolare predisposizione individuale, di sopravvenute complicazioni post-operatorie o di una scarsa attenzione del paziente ai suggerimenti impartiti, le cicatrici possono risultare di qualità scadente. E' bene quindi ricordare che il chirurgo plastico può garantire solo delle ferite chirurgiche suture con grande precisione, non delle cicatrici invisibili. Come in qualsiasi tipo di chirurgia, anche in chirurgia plastica estetica, sono possibili errori e complicanze. I primi, imprevedibili e indesiderabili e le seconde, prevedibili e a volte inevitabili, rientrano fra i rischi che ogni paziente deve considerare prima dell'intervento. Di conseguenza, per i suddetti motivi, pur rispettando le regole della chirurgia plastica, l'intervento potrebbe non determinare, seppure in casi particolari, il conseguimento degli obiettivi e del risultato auspicato che, di conseguenza, non può essere garantito o assicurato.

ISTRUZIONI

Questo documento è stato redatto per contribuire ad informarvi sull'intervento di LIFTING DIRETTO DEL LABBRO SUPERIORE e/o INFERIORE, sui relativi rischi e sui trattamenti alternativi.

È importante che leggete tutte queste informazioni con attenzione. Firmate ogni singola pagina, confermando di aver letto tutte le informazioni e firmate il consenso per l'intervento chirurgico suggerito dal Vostro chirurgo.

INTRODUZIONE

Il lifting del labbro è un intervento che mira ad aumentare l'eversione delle labbra, riducendo la distanza tra la base del naso ed il labbro superiore nonché tra il labbro inferiore ed il mento; questo intervento può essere eseguito con la tecnica definita "diretta" che consiste nella rimozione di

tessuto cutaneo all'altezza del "white roll" del labbro superiore e/o inferiore (ovvero subito al di sopra del termine della mucosa labiale quando diventa cute).

La tecnica "diretta" è in grado di conferire una eversione omogenea a tutto il labbro, sia superiore che inferiore se eseguita per tutta la larghezza delle labbra stesse, con una cicatrice che di conseguenza andrà a demarcare il bordo tra labbro e cute; nel caso si voglia modificare solo una parte del labbro o delle labbra è possibile eseguire un'escissione mirata solo di alcune aree, di conseguenza la cicatrice sarà meno estesa.

In ambo i casi non viene modificata la capacità dinamica di elevare il labbro, di conseguenza se il paziente eleva il labbro in modo asimmetrico nel pre operatorio continuerà a farlo anche nel post operatorio; questa tecnica chirurgica non agisce sui muscoli ma semplicemente su cute e sotto cute.

Questo intervento determinerà una esposizione maggiore dei denti quando il paziente sorride per tanto bisogna valutare attentamente il rapporto rischio/beneficio di questo intervento che potrebbe migliorare l'estetica labiale ma potrebbe peggiorare l'estetica del sorriso mostrando in dinamica delle porzioni della bocca (gengiva nel caso del gummy smile) o dei denti poco piacevoli.

TRATTAMENTI ALTERNATIVI

Trattamenti alternativi non chirurgici non esistono, tuttavia miglioramenti dell'area possono essere simulati con infiltrazioni di filler a base di acido ialuronico.

I RISCHI DI UN LIFTING DIRETTO DELLE LABBRA

Ogni intervento chirurgico comporta dei rischi seppur minimi ed è importante che capiate i rischi legati ad una lifting diretto delle labbra. La scelta individuale di sottoporsi ad un intervento chirurgico si basa sul confronto tra il rischio reale ed il beneficio potenziale. Anche se la maggior parte dei pazienti non avrà le complicazioni qui di seguito elencate, dovete analizzare ciascuna di queste complicazioni con il Vostro chirurgo per conoscere veramente tutte le conseguenze possibili di una cheiloplastica

Sanguinamento - E possibile, benché insolita, una perdita di sangue durante o dopo l'intervento. In caso di sanguinamento post-operatorio, può essere necessario un trattamento di emergenza per drenare il sangue accumulato (ematoma). Non prendere aspirine o farmaci antinfiammatori per dieci giorni prima dell'intervento, in quanto questo può aumentare il rischio di sanguinamento. Accumuli di sangue sotto la cute possono ritardare la guarigione e creare cicatrici. "Erbe" e supplementi dietetici possono aumentare il rischio di sanguinamento.

Infezione - L'infezione è abbastanza anomala in questo tipo di intervento. Se interviene un'infezione, è necessario continuare il trattamento antibiotico già iniziato o intraprendere un intervento supplementare.

Diminuita sensibilità della pelle – Dopo un lifting diretto delle labbra potrebbe verificarsi una eventuale diminuzione (o perdita) della sensibilità della pelle nella zona operata e potrebbe non scomparire completamente. Sensazioni costanti di prurito potrebbero verificarsi in questa area anatomica dopo questo tipo di intervento.

Irregolarità nel profilo - Irregolarità, depressioni e pieghe nella pelle adiacente alla cicatrice potrebbero verificarsi dopo un lifting delle labbra.

Cicatrizzazione – Cicatrici ipertrofiche sono molto rare. In casi rari, potrebbero formarsi delle cicatrici anomale. Le cicatrici possono risultare antiestetiche e di colore differente rispetto alla pelle circostante. Potrebbero rendersi necessari trattamenti supplementari compreso un altro intervento per eliminare una cicatrice anomala.

Modifica del metodo chirurgico per lifting diretto delle labbra - In alcune situazioni, a seconda di fattori emersi soltanto nel corso dell'intervento, il Vostro chirurgo potrebbe dover fare dei cambiamenti nella tecnica e nel metodo chirurgico; ciò potrebbe voler dire passare da un intervento con accessi chirurgici (tagli) differenti da quelli concordati pre-operatoriamente.

Anestesia chirurgica - Sia l'anestesia locale che totale comportano dei rischi. Vi è la possibilità di complicazioni, inconvenienti e addirittura di morte in tutte le forme di anestesia o sedazione.

Compromissione nervosa – Durante un intervento di lifting diretto delle labbra c'è il rarissimo pericolo di danneggiare sia i nervi motori che sensoriali. Dopo l'intervento possono verificarsi debolezza o perdita di motilità dell'area trattata. La maggior parte degli individui noterà un recupero della funzione motoria; l'astenia permanente è rara. Può anche verificarsi una

compromissione dei nervi sensoriali dell'area. Può verificarsi una diminuzione di sensibilità nell'area, l'intorpidimento permanente o una cicatrice su un nervo dolorante sono rari.

Va sottolineato che questo tipo di intervento non ha come scopo la modifica funzionale della contrazione del muscolo orbicolare, ovvero il muscolo che si trova nelle labbra; vien da se che una asimmetria in dinamica, come d'altra parte anche in statica, presente nel pre operatorio persisterà nel post operatorio

Asimmetria -Il volto è per sua natura asimmetrico. Sicuramente dopo l'intervento, se dividessimo a metà le labbra in due emi-lati, questi ultimi risulteranno asimmetrici se valutati singolarmente, come tutte le subunità del volto se comparate tra i due emi-volti; l'importanza di questo intervento però è dare armonia e ridurre la distanza tra la base del naso ed il labbro superiore nonché garantire l'eversione del labbro inferiore se questa tecnica viene rispettivamente effettuata per il labbro superiore, per il labbro inferiore o per entrambi. A volte potrebbero presentarsi asimmetrie legate alla perdita di ancoraggio di una delle suture interne o per una diastasi della cicatrice esterna, in questo caso sarà necessario reintervenire chirurgicamente

Guarigione lenta – Può verificarsi un'apertura della ferita o una sua guarigione lenta. Alcune zone di pelle possono deperire, richiedendo frequenti cambi di medicazioni o ulteriori interventi per rimuovere il tessuto non guarito. **I fumatori hanno un rischio più elevato di perdita della pelle e di complicanze durante la guarigione.**

Reazioni allergiche – Raramente sono state segnalate allergie locali a cerotti, materiale di sutura o medicazioni. Le reazioni sistemiche più serie possono derivare dai farmaci usati durante la chirurgia o da farmaci prescritti. Le reazioni allergiche possono richiedere un trattamento supplementare.

Siero - Raramente si verificano accumuli di liquido sotto la pelle. Se questo accade, ciò può richiedere trattamenti supplementari per il drenaggio del liquido.

Effetti a lungo termine - Alterazioni del risultato a livello delle labbra possono verificarsi dopo un certo periodo e sono riconducibili ad invecchiamento, perdita o aumento del peso, esposizione al sole o altre circostanze non legate all'intervento eseguito. L'intervento di lifting diretto delle labbra non arresta il processo di invecchiamento o non produce il rassodamento permanente dell'area trattata. Un ritocco o un intervento supplementare potranno rendersi necessari per mantenere costanti i risultati del lifting effettuato.

Dolore - Molto raramente si segnala dolore cronico dopo un lifting diretto delle labbra.

Risultato insoddisfacente - Potreste essere delusi dal risultato dell'intervento. Raramente, è necessario effettuare un ritocco per migliorare i risultati.

Gummy smile - Dopo un intervento di lifting diretto delle labbra a carico del labbro superiore potrebbe essere maggiormente esposta la gengiva al di sopra dei denti, questa condizione clinica a volte può essere particolarmente anti estetica e viene denominata "gummy smile" o "sorriso gengivale". La sua risoluzione, nel caso si verificasse, potrebbe necessitare di un supplementare intervento chirurgico riparativo.

NECESSITÀ DI UN INTERVENTO SUPPLEMENTARE

Ci sono molte variabili oltre al rischio e alle complicazioni chirurgiche potenziali che possono influenzare il risultato duraturo di un lifting diretto delle labbra. Anche se i rischi e le complicazioni si verificano raramente, i rischi citati sono quelli che sono maggiormente associati con un intervento di lifting diretto delle labbra. Altre complicanze e rischi possono verificarsi, ma sono più rari. Se dovessero emergere delle complicazioni, può essere necessario un intervento supplementare o altri trattamenti. L'impiego della medicina e della chirurgia non è una scienza esatta. Anche se sono prevedibili buoni risultati, non c'è garanzia assoluta o implicita che tali risultati possano essere ottenuti.

Autorizzo il Dr Rauso

ed i suoi collaboratori ad eseguire su di me l'intervento di **LIFTING DIRETTO DELLE LABBRA**

So che dovrò essere sottoposto/a ad anestesia

Autorizzo il Dr Rauso

ed i suoi collaboratori a modificare secondo scienza e coscienza e secondo le contingenti necessità le tecniche programmate, sia nel corso dell'intervento stesso che nel periodo post-operatorio, essendo informato/a che, in caso contrario, potrei compromettere l'esito dell'intervento.

Poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può essere precisamente prognosticata a priori la

percentuale di miglioramento del difetto da correggere e l'entità la durata del risultato, così come la qualità delle cicatrici residue e l'eventuale costituzione di ematomi e sieromi, in quanto tali eventi dipendono non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate ma ancor più dalle risposte dell'organismo. Tali complicazioni possono essere trattate e a tal fine acconsento a sottopormi alle cure del caso, eventualmente anche chirurgiche.

Acconsento ad essere fotografato/a e/o ripreso prima, durante e dopo l'intervento dal Dr Rauso e/o dalla sua equipe.

Esonero il Dr Rauso e la sua equipe da qualsiasi tipo di controversia legale post operatoria (richieste di risarcimento) nel caso subentri una o più complicanze contemplate per questo intervento, a meno che non sia possibile chiaramente dimostrare una responsabilità diretta legata ad un errore professionale. Inoltre sono cosciente che nel caso subentrassero delle complicanze post operatorie che richiedono un reintervento dovrò sostenere le "spese vive" (clinica ed eventuali materiali protesici), mentre il supporto dell'equipe chirurgica sarà gratuito.

Firma del paziente.

.....

Firma del chirurgo

.....

Data e luogo

.....